



Impfkalender 2015/2016 - Welche Impfungen sind empfohlen?

Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO), Stand August 2015

 Säuglinge und Kleinkinder
(2 – 23 Monate)

 Kinder und Jugendliche
(2 – 17 Jahre)

 Erwachsene
(ab 18 Jahre)

Impfungen	Säuglinge und Kleinkinder (2 – 23 Monate)					Kinder und Jugendliche (2 – 17 Jahre)				Erwachsene (ab 18 Jahre)		
	6 Wochen	2 Monate	<u>U4</u> 3 Monate	4 Monate	<u>U6</u> 11–14 Monate	<u>U7</u> 15–23 Monate	2–4 Jahre	<u>U9</u> 5–6 Jahre	<u>J1</u> 9–14 Jahre	15–17 Jahre	ab 18 Jahre	ab 60 Jahre
Tetanus >		G1	G2	G3	G4	N	→	A1	A2		A (alle 10 Jahre)	
Diphtherie >		G1	G2	G3	G4	N	→	A1	A2		A (alle 10 Jahre)	
Keuchhusten (Pertussis) >		G1	G2	G3	G4	N	→	A1	A2		A ^d	
Hib (Haemophilus influenzae Typ b) >		G1	G2	G3	G4	N	→					
Kinderlähmung (Poliomyelitis) >		G1	G2	G3	G4	N	→		A		ggf. N	→
Hepatitis B >		G1	G2	G3	G4	N	→					
Pneumokokken >		G1 ^b		G2	G3	N						S ^f
Rotaviren >	G1 ^a	G2	(G3)									
Meningokokken C >					G (ab 12 Monaten)	N	→					
Masern >					G1	G2	→				S ^e	
Mumps >					3-fach- Impfung MMR	3-fach- Impfung MMR + Windpocken	→					
Röteln >					3-fach- Impfung MMR	3-fach- Impfung MMR + Windpocken	→					
Windpocken (Varizellen) >					G1	G2	→					
Gebärmutterhalskrebs (HPV) >									♀ G1+G2 ^c	♀ N ^c		
Grippe (Influenza) >												S (jährlich)

Personen mit chronischen Erkrankungen (jährlich) und für Schwangere

- U** Überlappungen mit Früherkennungsuntersuchung Kinder
- G** Grundimmunisierung (bis zu vier Teilimpfungen G1 - G4)
- S** Standardimpfung
- ♀** Impfempfehlungen für Mädchen und junge Frauen

- J** Überlappungen mit Früherkennungsuntersuchung Jugendliche
- N** Nachholimpfung (bei unvollständigem Impfschutz)
- A** Auffrischimpfung

^a die 1. Impfung möglichst ab vollendeter 6. Lebenswoche, je nach Impfstoff 2 bzw. 3 Schluckimpfungen (G2/G3) mit einem Mindestabstand von 4 Wochen
^b Frühgeborene erhalten eine zusätzliche Impfung im Alter von 3 Monaten (insgesamt 4 Impfungen)
^c je nach Impfstoff 2 Impfungen im Alter von 9–13 bzw. 9–14 Jahren, bei Nachholen der HPV-Impfung ab einem Alter von 13 bzw. 14 Jahren 3 Impfungen
^d einmalige Auffrischung; möglichst mit der nächsten Impfung gegen Tetanus/Diphtherie/ggf. Poliomyelitis
^e Impfung für alle nach 1970 Geborene mit unklarem Immunschutz
^f einmalige Impfung ab 60 Jahre, je nach Gesundheitszustand ggf. Auffrischung